

ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

метрибузин, 600 г/л

Долгая защита —  
сильная культура





ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

Общая информация





ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

## Общая характеристика

Системный гербицид против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков на многих культурах





ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

Общая  
характеристика

**Препаративная форма**  
суспензионный концентрат

**Культуры**  
картофель, томаты, соя,  
кукуруза, люцерна, нут, люпин,  
пшеница и рожь озимые

**Спектр действия**  
однолетние двудольные  
и некоторые злаковые сорняки

---

**метрибузин, 600 г/л**

---



ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

## Преимущества

- широкий спектр гербицидной активности
- удобная в применении препаративная форма
- действие на сорняки через корни и листья
- продолжительный период защитного действия
- широкий диапазон применения: до всходов или после всходов культуры
- возможность дробного внесения, что позволяет снизить нормы расхода препарата



# Лазурит® Ультра

## Чувствительные сорняки

- амброзия полыннолистная
- василек синий
- вероника (виды)
- галинсога мелкоцветная
- горец (виды)
- горчица полевая
- дескурайния Софии
- дымянка аптечная
- звездчатка средняя
- канатник Теофраста
- лисохвост полевой
- марь (виды)
- мятлик однолетний
- осот огородный
- пастушья сумка
- паслен черный
- пикульник (виды)
- просо куриное
- ромашка непахучая
- редька дикая
- щирица (виды)
- ярутка полевая  
и другие виды



ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

## Механизм действия

Абсорбируется преимущественно корнями сорняков, но может проникать в растение и через листья. Перемещается акропетально





# Лазурит® Ультра

## Скорость воздействия

---

### Уничтожает сорняки:

---

- **при довсходовом применении** – в момент их прорастания;
- **при послевсходовом применении** – в течение 10 - 20 суток





# Лазурит® Ультра

## Период защитного действия

---

**1 - 2 месяца  
в зависимости  
от погодных условий,  
механического состава,  
содержания гумуса,  
степени окультуренности  
поля (запаса семян  
сорняков, их видового  
состава)**

---





# Лазурит® Ультра

## Регламенты применения

| Культура                        | Способ и сроки обработки                                                                        | Норма расхода препарата, л/га |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Картофель (кроме ранних сортов) | Опрыскивание почвы до всходов культуры                                                          | 0,8 - 1,6                     |
|                                 | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы картофеля 5 см | (0,6 - 1,2) + 0,35            |
|                                 | Опрыскивание сорняков при высоте культуры до 5 см                                               | 0,8 - 0,9                     |



# Лазурит® Ультра

## Регламенты применения

| Культура         | Способ и сроки обработки                                                       | Норма расхода препарата, л/га |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Томаты рассадные | Опрыскивание почвы до высадки рассады                                          | 1,3 - 1,6                     |
|                  | Опрыскивание сорняков через 15 - 20 дней после высадки рассады томатов в грунт | 1,2                           |
| Томаты посевные  | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев культуры                             | 0,8                           |
|                  | Опрыскивание посевов последовательно в фазах 1 - 2 и 3 - 5 листьев культуры    | 0,3 + 0,5                     |



# Лазурит® Ультра

## Регламенты применения

| Культура | Способ и сроки обработки                                                           | Норма расхода<br>препарата, л/га |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Соя      | Опрыскивание почвы до всходов культуры                                             | 0,5 - 1                          |
| Кукуруза |                                                                                    | 0,9 - 1,2                        |
|          | Опрыскивание почвы до всходов культуры<br>и повторно в фазе 3 - 4 листьев культуры | 0,6 + 0,6                        |



# Лазурит® Ультра

## Регламенты применения

| Культура                       | Способ и сроки обработки                                    | Норма расхода препарата, л/га |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Люцерна первого года вегетации | Опрыскивание почвы до всходов культуры                      | 0,3 - 0,75                    |
| Люцерна старовозрастная        | Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры (3 - 5 см) |                               |



# Лазурит® Ультра

## Регламенты применения

| Культура              | Способ и сроки обработки                                  | Норма расхода препарата, л/га |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Нут                   | Опрыскивание почвы до всходов культуры                    | 0,25 - 0,6                    |
| Люпин                 |                                                           | 0,3 - 0,75                    |
| Пшеница и рожь озимые | Опрыскивание посевов осенью в фазе 2 - 4 листьев культуры | 0,23 - 0,35                   |



# Лазурит® Ультра

## Особенности применения

На раннем картофеле желательно применять препарат дробно, при этом в первую обработку обязательно соблюдать норму расхода 0,6 л/га, особенно при неблагоприятных погодных условиях (сильных дождях) в период всходов





# Лазурит® Ультра

## Особенности применения

**Максимальные дозировки** вносят на тяжелых по механическому составу почвах, **минимальные** – на легких.

На песчаных почвах с содержанием гумуса (менее 1 %) использовать препарат не рекомендуется. На почвах с содержанием гумуса более 6 %, а также на торфяниках и «заплывающих» землях опрыскивание лучше провести по уже взошедшим сорнякам.

Перед обработкой поверхность почвы должна быть хорошо разделана, без комьев. Не следует перемешивать почву во время обработки и в первые дни после нее



# Лазурит® Ультра

## Фитотоксичность

При использовании в рекомендованных нормах расхода не отмечена.

Есть сорта картофеля, чувствительные к метрибузину в период вегетации, а также не переносящие даже малейшего контакта с этим д. в. (уточняйте информацию у оригинаторов сортов).

При использовании препарата на сое и нуте в условиях обильных осадков нужно избегать высоких норм применения препарата: его промывка в корнеобитаемый слой может вызывать угнетение культуры, которое может сказаться на урожае



**ГЕРБИЦИД**

# Лазурит® Ультра

**Расход рабочей жидкости**

**100 - 300 л/га**





# Лазурит® Ультра

## Ограничения по севообороту

Зерновые культуры, горох, чечевицу не рекомендуется высевать **ранее 8 месяцев** после применения максимальных норм препарата. Чувствительные к метрибузину сорта картофеля не следует высаживать **ранее 12 месяцев** после применения препарата. Сахарную свеклу, рапс, лук, подсолнечник и другие чувствительные культуры не рекомендуется высевать **ранее 18 месяцев** после использования гербицида



ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

## Совместимость

avgust crop protection

Можно применять в баковых смесях с другими пестицидами.  
Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость  
и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре



ГЕРБИЦИД

# Лазурит® Ультра

Испытания





ГЕРБИЦИД

avgust   
crop protection

# Лазурит® Ультра

## Полевой производственный опыт

### **Культура:**

картофель, сорта Журавинка  
и Ред Скарлет

### **Сорняки:**

просо куриное

### **Норма расхода:**

1,2 л/га (опрыскивание почвы  
до всходов культуры)

**Брянская область,  
Брянский государственный  
аграрный университет**



**ГЕРБИЦИД**

# Лазурит® Ультра


## Результаты применения

**Высота ботвы картофеля 10 - 15 см.**

**Эффективность Лазурита Ультра по массе сорняка – 98 %**



Вариант Лазурит Ультра



Контроль без обработки



# Лазурит® Ультра

## Результаты применения



Сорт Журавинка



Сорт Ред Скарлет



ГЕРБИЦИД

avgust crop protection

# Лазурит® Ультра

## Полевой производственный опыт

### Культура:

картофель, сорт Дединовский

### Сорняки:

злаковые и двудольные, в т. ч. просо куриное, марь белая, щирица запрокинутая, полевой заборный, горец почечуйный, латук татарский, паслен черный

### Норма расхода:

1,2 л/га (опрыскивание почвы после посадки культуры)

Московская область,  
ООО «СПК имени Ленина»



**ГЕРБИЦИД**

# Лазурит® Ультра

## Результаты применения

Через 15 дней после обработки.  
Эффективность Лазурита Ультра по массе сорняков – 70 %



Вариант Лазурит Ультра



Контроль без обработки



Лазурит® Ультра

Свидетельство о регистрации



| Для сельскохозяйственного производства: |                                |                                          |                                                                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Норма расхода препарата, л/га           | Культура                       | Вредный объект                           | Способ, время, особенности применения                                                                                         | Срок ожидания (кратность обработок) |
| 1                                       | 2                              | 3                                        | 4                                                                                                                             | 5                                   |
| 1,3-1,6                                 | Томаты (рассадные)             | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                                                 | 60(1)                               |
| 1,2                                     |                                |                                          | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                  |                                     |
| 0,8                                     | Томаты (посевные)              |                                          | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                                      | 60(2)                               |
| 0,3+0,5                                 |                                |                                          | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                |                                     |
| 0,8-1,6                                 | Картофель (кроме раннелетнего) |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                                                | 60(1)                               |
| 0,6-1,2+0,35                            |                                |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(2)                               |
| 0,8-0,9                                 | Соя                            |                                          | Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                                  | 60(1)                               |
| 0,5-1,0                                 |                                |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                                                | 60(2)                               |
| 0,9-1,2                                 |                                |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га         |                                     |
| 0,6 + 0,6                               | Люцерна первого года вегетации |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                                                | -(1)                                |
| 0,3-0,75                                |                                |                                          | Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры (3-5 см). Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га                             |                                     |

| Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Лазурит Ультра, СК (600 г/л метрибузина) от 23 апреля 2020 г. № 2652 |                                              |                                          |                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Для личных подсобных хозяйств:                                                                                                              |                                              |                                          |                                                                                                                             |                                     |
| Норма расхода препарата                                                                                                                     | Культура                                     | Вредный объект                           | Способ, время, особенности применения                                                                                       | Срок ожидания (кратность обработок) |
| 1                                                                                                                                           | 2                                            | 3                                        | 4                                                                                                                           | 5                                   |
| 13-16 мл/3 л воды                                                                                                                           | Томаты рассадные                             | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²                                                 | 60(1)                               |
| 12 мл/3 л воды                                                                                                                              |                                              |                                          | Опрыскивание почвы через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²                     |                                     |
| 8 мл/3 л воды                                                                                                                               | Томаты посевные                              |                                          | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²                                      | 60(2)                               |
| 3 мл/3 л воды + 5 мл/3 л воды                                                                                                               |                                              |                                          | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²                |                                     |
| 8-16 мл/3 л воды                                                                                                                            | Картофель (кроме раннелетнего использования) |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²                                                | 60(1)                               |
| 6-12 мл/3 л воды + 3,5 мл/3 л воды                                                                                                          |                                              |                                          | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м² | 60(2)                               |
| 8-9 мл/3 л воды                                                                                                                             |                                              |                                          | Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м²                                  | 60(1)                               |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.  
Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



# Лазурит® Ультра

## Свидетельство о регистрации



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**ДОПОЛНЕНИЕ**  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 424 от « 24 » апреля 2023 г.

**К СВИДЕТЕЛЬСТВУ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ  
АГРОХИМИКАТА**

№ 2652 от « 23 » апреля 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано  
АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958  
(наименование организации, ОГРН)

ФГИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  
пестицид Лазурит Ультра, СК (600 г/л метрибузина)  
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-03-2652-1/424 на срок по  
« 22 » апреля 2030 г. и допускается к обороту на территории  
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами  
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

  
М. П.  
№000501

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата, л/га | Культура              | Вредный объект                                   | Способ, время обработки, особенности применения                                                 | Срок ожидания (кратность обработок) |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                | 2                     | 3                                                | 4                                                                                               | 5                                   |
| 0,25-0,6                         | Нут                   | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га                  | 60(1)                               |
| 0,3-0,75                         | Люпин                 |                                                  | Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1)                                |
| 0,23-0,35                        | Пшеница и рожь озимые |                                                  |                                                                                                 |                                     |

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.


Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.




# Мобильные приложения



**Каталог продукции**  
для России и Беларуси



Лазурит® Ультра



**Август Чекер.**  
Защита от контрафакта







С нами расти легче

[avgust.com](https://avgust.com)