

РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Паклобутразол, 250 г/л

Рост
по плану



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Общая информация



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Общая характеристика

avgust crop protection

Системный ретардант с фунгицидными свойствами для обработки рапса, яблони, картофеля и газонных трав.

Препарат ингибирует вегетативный рост и увеличивает образование плодовых почек у яблони, замедляет рост и уменьшает полегание полевых культур, повышает морозостойкость озимых.

Кроме того, действующее вещество препарата проявляет фунгицидную активность в отношении возбудителей мучнистой росы и парши плодовых культур



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Общая
характеристика

avgust crop protection

Паклобутразол, 250 г/л

Препаративная форма
Суспензионный концентрат

Культуры
Рапс яровой и озимый, картофель,
яблоня, травы газонные

Назначение
Регулятор роста для рапса, картофеля,
яблони и газонных трав

РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Преимущества

avgust crop protection

- сочетание фунгицидных и росторегулирующих свойств
- снижение высоты растений и длины побегов, предотвращение полегания рапса
- повышение количества и улучшение качества урожая
- снижение силы роста и длины однолетних приростов яблони
- стандартизация размера клубней картофеля

Гравиэт®

Механизм действия

Паклобутразол – системный ретардант с фунгицидными свойствами, антагонист гиббереллина (фитогормон). Действует путем подавления биосинтеза гиббереллина



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Скорость воздействия

**Эффект проявляется спустя
12 - 24 часа после обработки**



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Период защитного
действия

**Эффект сохраняется
вплоть до уборки
урожа**



Гравиэт®

Регламенты применения

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Рапс яровой	Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	0,15 - 0,25	Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания

Гравиэт®

Регламенты применения

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Рапс озимый	Повышение устойчивости растений к низким температурам, улучшение перезимовки, снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	0,15 - 0,25	Первое опрыскивание растений в фазе 5 - 6 настоящих листьев (осенью)
		0,25	Повторное опрыскивание растений в фазе начала стеблевания (весной)

Гравиэт®

Регламенты применения

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Картофель	Снижение высоты растений, активизация формообразовательных процессов, увеличение размера клубней, повышение урожайности, улучшение качества продукции	0,8 - 1	Опрыскивание растений в фазе полных всходов (при высоте растений 15 - 20 см)
Яблоня	Снижение длины прироста однолетних побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	1 - 2	Опрыскивание в период отрастания молодых побегов (при длине 5 - 10 см)

Гравиэт®

Регламенты применения

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Травы газонные	Предотвращение быстрого перерастания травостоя, активизация формирования корневой системы, увеличение густоты стояния травостоя	2,2 - 3,3	Опрыскивание растений: 1-е – через 2 - 3 дня после первого скашивания (весной), 2-е – через 6 - 8 недель

Гравиэт®

Регламенты применения

Культура	Назначение	Норма расхода препарата, л/га	Способ и сроки обработки
Травы газонные (с содержанием мятлика менее 50 %)	Предотвращение быстрого перерастания травостоя, активизация формирования корневой системы, увеличение густоты стояния травостоя	0,8 - 1	Опрыскивание растений через 2 - 3 дня после последнего скашивания (осенью)
Травы газонные (с содержанием мятлика более 50 %)		1 - 2	

РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Рекомендации
по применению

avgust crop protection

Показатель pH воды для приготовления рабочего раствора – 4,5 - 6,5.

На **яровом рапсе** препарат применяют в фазе начала стеблевания культуры; на **озимом рапсе** проводят две обработки: первую – осенью, в фазе 5 - 6 настоящих листьев культуры, вторую – весной, в фазе начала стеблевания.

Картофель опрыскивают однократно в период образования клубней при высоте растений 15 - 20 см

Яблоню обрабатывают в период начала роста побегов при длине молодых побегов 5 - 10 см. Лучший эффект достигается при дробном внесении препарата (1 л/га + 1 л/га). В этом случае повторная обработка проводится на 14 - 21-е сутки после первой).

На **газонных травах**, в зависимости от целей и состава травостоя, опрыскивание проводят через 2 - 3 дня после скашивания (весной или осенью), весной возможна повторная обработка через 6 - 8 недель после первой

Гравиэт®

Расход рабочей жидкости

На полевых культурах –
200 - 400 л/га;
на яблоне – 1000;
на газонных травах –
800 - 1000 л/га



РЕГУЛЯТОР РОСТА

Гравиэт®

Совместимость

avgust crop protection

Препарат совместим с различными пестицидами, за исключением препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией. В каждом конкретном случае необходимо проверять совместимость компонентов перед приготовлением баковой смеси, а готовую смесь – на фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре

Гравиэт®

Выписка из реестра пестицидов и агрохимикатов

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ФИРМА "АВГУСТ", ОГРН 1025006038958

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Гравиэт, СК (250 г/л паклобутразола)
(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:
номер государственной регистрации 021-07-10047-0
дата государственной регистрации 14 июля 2026 г.
на срок по 13 июля 2029 г. и допущенный к обороту
на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	Культура	Назначение	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (крат- ность обрабо- ток) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механиз- рованных работ
1	2	3	4	5	6
0,15-0,25 л/га	Рпмс яровой	Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательны х процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50 (1)	7/3

0,15-0,25 л/га	Рпмс озимый	Повышение устойчивости растений к низким температурам, улучшение перезимовки, снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательны х процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 5-6 настоящих листьев (осенью), 2-е – в фазе начала стеблевания (весной). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50 (2)	7/3
0,8-1 л/га	Картофель	Снижение высоты растений, активизация формообразовательны х процессов, увеличение размера клубней, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе полных всходов (при высоте растений 15-20 см). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (1)	7/3
1-2 л/га	Яблоня	Снижение длины прироста однолетних побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период отрастания молодых побегов (при длине молодых побегов 5-10 см). Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	25 (1)	7/3
2,2-3,3 л/га	Травы газонные	Предотвращение быстрого перерастания травостоя, активизация формирования корневой системы, увеличение густоты стояния травостоя.	Опрыскивание растений: 1-е – через 2-3 дня после первого скашивания (весной), 2-е – через 6-8 недель после первого опрыскивания. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	- (2)	3/-
1,1-2,2 л/га	Травы газонные (с содержанием мятлика менее 50%)	Предотвращение быстрого перерастания травостоя, активизация формирования корневой системы, увеличение густоты стояния травостоя.	Опрыскивание растений через 2-3 дня после последнего скашивания (осенью). Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	- (1)	3/-
0,6-1,1 л/га	Травы газонные (с содержанием мятлика более 50%)	Предотвращение быстрого перерастания травостоя, активизация формирования корневой системы, увеличение густоты стояния травостоя.	Опрыскивание растений через 2-3 дня после последнего скашивания (осенью). Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	- (1)	3/-

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне
водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 14.07.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)


А.В. Ариткулов
(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027

Мобильные приложения



Гравиэт®



ФИО докладчика. Наименование подразделения





С нами расти легче

avgust.com