



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3532 от « 18 » марта 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Магнум Супер, ВДГ (450 г/кг трибенурон-метила +  
(наименование пестицида или агрохимиката)  
300 г/кг метсульфурон-метила)

получил государственную регистрацию за № 021-03-3532-1

на срок по « 17 » марта 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)



№ 003961





Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата кг/га	Культуры	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,012 0,012 (А)	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения – фазу формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиационной обработке – 25-50 л/га	60(1)
0,009 0,009 (А)			Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиационной обработке – 25-50 л/га	
0,012 0,012 (А)			Опрыскивание посевов в фазе формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиационной обработке – 25-50 л/га	





Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Магнум Супер, ВДГ (450 г/кг трибенурон-метила + 300 г/кг метсульфурон-метила) от 18 марта 2022 г. № 3532

1	2	3	4	5
0,009-0,012 0,009-0,012 (А)	Овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры – фазу формирования второго междоузлия культуры (с учетом чувствительности сортов) и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиационной обработке – 25-50 л/га	60(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

