



Д

М

В

К

Э



Точный расчет в борьбе
с болезнями

ФУНГИЦИД

азоксистробин, 250 г/л +
боскалид, 150 г/л

- Исключительно высокая эффективность против склеротиниоза рапса и сои, надежная защита от альтернариоза картофеля и рапса
- Комбинация двух высокоэффективных системных действующих веществ
- Выраженное положительное физиологическое действие на растения

Эвклид® – фунгицид для защиты многих культур от наиболее вредоносных болезней

Препарат выпускается в форме суспензионного концентрата.

Азоксистробин – действующее вещество из класса стробилуринов, ингибирует митохондриальное дыхание в клетках патогенов. Характеризуется длительным защитным и озеленяющим эффектом.

Боскалид относится к химическому классу карбоксамидов, системно продвигается к верхушке листовой пластинки и побега и частично остается на поверхности растения. Блокирует обменные процессы в клетках патогенов. Оказывает стимулирующий эффект на растения.


Эвклид® способствует увеличению урожайности и качества продукции, улучшает лежкость картофеля при хранении. Препарат безопасен для насекомых-опылителей.

Защитное, антиспорлирующее действие Эвклид® обеспечивает сразу же после обработки растений. В зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки, препарат защищает посевы от инфекции до 4 недель с момента опрыскивания.

Для достижения максимального эффекта от обработки фунгицид рекомендуется применять на ранней стадии развития болезней. Однократное опрыскивание проводят при появлении первых признаков одной из болезней (или в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе на рапсе и в фазе начало бутонизации на подсолнечнике). В том случае, если разрешена двукратная обработка, препарат применяют повторно через 10 – 14 дней.

Эвклид® является комбинированным препаратом на основе двух действующих веществ с различным механизмом действия, что существенно снижает риск возникновения резистентности у патогенов.

Препарат совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильноокислой или сильнощелочной реакцией.



Расход рабочей жидкости, л/га
200 – 400

Упаковка
Канистры по 5 л

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания (кратность обработок)
Рапс озимый	Фомоз, склеротиниоз, альтернариоз, мучнистая роса	0,6 – 0,8	40 (1)
Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, альтернариоз	0,6 – 0,8	50 (2)
Картофель	Альтернариоз	0,4 – 0,5	5 (2)
Горох	Аскохитоз	0,6 – 0,8	20 (1)
	Ржавчина	0,8	
Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная и гельминтоспориозная стеблевая гниль	0,8 – 1	50 (1)
Соя	Аскохитоз, церкоспороз, септориоз	0,6 – 0,8	35 (1)

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust crop protection

avgust.com ул. Цандера, д. 6, Москва, 129515. +7 495 787-08-00