

ГЕРБИЦИД Фабиан®

Имазетапир, 450 г/кг +
хлоримурон-этил, 150 г/кг

Уникальный гербицид —
идеальная соя!

avgust 
crop protection



ГЕРБИЦИД
Фабиан®

Общая информация



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Общая характеристика

avgust crop protection

Комбинированный гербицид для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными, а также с однолетними злаковыми сорняками в посевах сои



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Общая характеристика

avgust 
crop protection

**Имазетапир, 450 г/кг
+ хлоримурон-этил, 150 г/кг**

Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы

Культура
соя

Спектр действия
большинство видов сорняков, включая
осоты, амброзию, повилику

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Преимущества

avgust 
crop protection

- Широкий спектр действия, уничтожение большинства видов сорняков, включая осоты, амброзию, повилику
- Пластичность по срокам применения – внесение до посева, до всходов или по вегетации культуры
- Действие на сорняки через листья и корни
- Почвенная гербицидная активность
- Длительный период защитного действия – до 90 дней

Фабиан®

Спектр действия

Чувствительны:

- акалифа южная
- амброзия полыннолистная
- бодяк полевой
- горец (виды)
- горчица полевая
- гулявник (виды)
- дескурайния Софии
- дурнишник (виды)
- звездчатка средняя
- канатник Теофраста
- костер (виды)

- лебеда (виды)
- лисохвост полевой
- молочай-солнцегляд
- мятлик однолетний
- овсюг полевой
- осот полевой
- пастушья сумка
- пикульник обыкновенный
- подсолнечник сорный
- просо (виды)
- редька дикая
- росичка кроваво-красная

- щетинник (виды)
- щирица (виды)

Умеренно чувствительны:

- вьюнок полевой
- дымянкa аптечная
- марь (виды)
- коммелина обыкновенная
- пырей ползучий
- сорго алеппское (гумай)

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Механизм действия

avgust crop protection

Действующие вещества быстро, в течение нескольких часов после обработки, проникают через листья и корни сорных растений, передвигаются по флоэме и ксилеме и накапливаются в точках роста.

Гербицидное действие препарата выражается в подавлении процессов синтеза протеина, что приводит к нарушению деления и роста клеток меристем сорняков

Фабиан®

Скорость воздействия

Останавливает рост чувствительных сорных растений через несколько часов после обработки. Сорняки почти сразу перестают конкурировать с растениями сои, хотя симптомы действия могут быть незаметны еще несколько дней. Полная гибель сорных растений, в зависимости от погодных условий, происходит в течение 3 - 4 недель



Фабиан®

Период защитного действия

В зависимости от почвенно-климатических условий, степени засоренности поля, видового состава и фазы развития сорняков на момент обработки обеспечивает защиту посевов сои от сорняков в течение 60 - 90 суток с момента обработки



Фабиан®

Регламенты применения

Культура	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, г/га
Соя	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры или опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (до 2 - 3 листьев злаковых и до 4 - 6 листьев двудольных) независимо от фазы развития культуры	100
	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (до 2 - 3 листьев злаковых и до 4 - 6 листьев двудольных) независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,2 л/га ПАВ Адыо	80 - 100

Фабиан®

Особенности применения

- При невысокой и средней засоренности однолетними и многолетними двудольными (в т. ч. видами осота) и однолетними злаковыми сорняками: обработать почву до посева или до всходов сои или осуществить раннее послевсходовое применение Фабиана.
- При сплошном посеве сои: внести Фабиан после посева культуры до всходов сорняков. Поскольку препарат обладает также почвенной гербицидной активностью, большое влияние на его эффективность оказывают качественная разделка и достаточная влажность почвы.
- Не рекомендуется проводить механические обработки посевов в течение 3 недель после опрыскивания

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

avgust 
crop protection

**Препарат не фитотоксичен для
обрабатываемой культуры при
соблюдении регламентов применения**



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Возможность возникновения
резистентности

avgust 
crop protection

**Во избежание появления резистентности к препарату
рекомендуется чередовать применение Фабиана с гербицидами
из других химических классов с иным механизмом действия**

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Расход рабочей жидкости

300 л/га



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Совместимость

avgust 
crop protection

Совместим с различными пестицидами, за исключением препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией. В каждом конкретном случае необходимо проверять совместимость компонентов перед приготовлением баковой смеси, а готовую смесь – на фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

Не следует применять препарат совместно с ФОС-инсектицидами и чередовать с ними, если между опрыскиваниями проходит менее 14 дней

ГЕРБИЦИД

Фабриан®

Испытания



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Полевой
производственный опыт

avgust 
crop protection

**Краснодарский край,
Тбилисский район,
ЗАО «Заря»**

Культура:

СОЯ

Сорняки:

однолетние и многолетние
двудольные и злаковые

Норма расхода:

100 г/га

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Сорняки до обработки



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Через 10 суток



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Через 68 дней



Контроль без обработки



Обработка Фабианом, 100 г/га

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Полевой
производственный опыт

avgust 
crop protection

**Краснодарский край,
Тбилисский район,
ЗАО «Заря»**

Культура:

СОЯ

Сорняки:

однолетние злаковые и однолетние
и многолетние двудольные

Норма расхода:

Фабиан, 80 - 100 г/га + Пав Адью, 0,2 л/га

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Сорняки до обработки



ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Через 5 суток



Фабиан, 80 г/га + Адью 0,2 л/га



Фабиан, 100 г/га + Адью 0,2 л/га

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Через 5 суток



Фабиан, 80 г/га + Адью 0,2 л/га



Фабиан, 100 г/га + Адью 0,2 л/га

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Через 10 суток



Контроль без обработки



Фабиан, 80 г/га + Адью 0,2 л/га



Фабиан, 100 г/га + Адью 0,2 л/га

ГЕРБИЦИД

Фабиан®

Результаты применения

Через 38 суток



Фабиан, 80 г/га + Адью 0,2 л/га



Фабиан, 100 г/га + Адью 0,2 л/га

Фабиан®

Свидетельство
о регистрации



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (до 2-3 листьев у злаков и до 4-6 листьев у двудольных) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 300 л/га Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	60(1)
0,08-0,1			Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (до 2-3 листьев злаков и до 4-6 листьев у двудольных) с добавлением 200 мл/га ПАВ АДЬЮ, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.
Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Сервисы «Августа»



**Каталог
продукции**



**Август Чекер.
Защита от контрафакта**



**Социальные
сети**



С нами расти легче

avgust.com