



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4880 от « 2 » июня 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано  
АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  
пестицид Кредо, СК (500 г/л карбендазима)

(наименование пестицида или агрохимиката)

021-02-4880-0

получил государственную регистрацию за №  
1 июня 2028

на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№005453

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения пестицида, л/т; л/га | Культура               | Вредный объект                                                                                                                                                 | Способ, время, особенности применения                                                    | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                     | 2                      | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                        | 5                                    |
| 1,0-1,5                               | Пшеница яровая, озимая | Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян, септориоз                         | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | - (1)                                |
|                                       | Пшеница озимая         | Снежная плесень                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |
| 0,3-0,6                               | Пшеница яровая, озимая | Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии)                                                                                                         | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га                      | 40 (1)                               |
| 0,6                                   |                        | Фузариоз колоса                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |
| 0,5-0,6                               |                        | Мучнистая роса, септориоз                                                                                                                                      |                                                                                          | 40 (2)                               |
| 0,3-0,6                               | Пшеница озимая         | Церкоспореллез, снежная плесень                                                                                                                                |                                                                                          | 40 (1)                               |
| 1,0-1,5                               | Ячмень яровой, озимый  | Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | - (1)                                |
| 0,3-0,6                               |                        | Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии)                                                                                                         | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га                      | 40 (1)                               |
| 0,5-0,6                               |                        | Мучнистая роса                                                                                                                                                 |                                                                                          | 40 (2)                               |
| 1,0-1,5                               | Рожь озимая            | Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня, плесневение семян                                                                              | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | - (1)                                |
| 0,3-0,6                               |                        | Снежная плесень, фузариозная корневая гниль                                                                                                                    | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га                      | 40 (1)                               |
| 0,5-0,6                               |                        | Мучнистая роса                                                                                                                                                 |                                                                                          | 40 (2)                               |



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Кредо, СК (500 г/л карбендазима) от 2 июня 2025 г. № 4880

| 1       | 2               | 3                                                                                                      | 4                                                                                         | 5      |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0,6-0,8 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса                                                                            | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га                       | 30 (3) |
| 1,5     | Соя             | Аскохитоз, фузариозы (фузариозная корневая гниль и фузариозное увядание), антракноз, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 5-6 л/т | - (1)  |

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в личных подсобных хозяйствах и в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

