

ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

ципродинил, 500 г/кг

Спасет плоды
от парши
и монилиоза

avgust 
crop protection



ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Общая информация



ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Общая
характеристика

avgust crop protection

Системный фунгицид для защиты
семечковых и косточковых плодовых
культур



ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Общая
характеристика

avgust crop protection

ципродинил, 500 г/кг

Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы

Культуры
яблоня, груша, вишня, черешня, слива

Спектр действия
комплекс заболеваний культур

Плантенол Нео®

Преимущества

- высокая эффективность защиты яблони и груши от парши
- эффективный контроль монилиального ожога и плодовой гнили косточковых культур
- отличная дождестойкость и надежное действие даже при низких температурах
- системное действие, профилактический и лечащий эффект
- использование в антирезистентных стратегиях защиты плодовых культур
- сильное искореняющее действие и «стоп-эффект» в баковых смесях с триазолами
- технологичная препаративная форма

ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Спектр действия

avgust crop protection

На яблоне и груше:

парша, альтернариоз, монилиоз,
мучнистая роса

На вишне, черешне и сливе:

монилиальный ожог, плодовая гниль

ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Механизм действия

Ципродинил ингибирует биосинтез метионина

Плантенол Нео®

Скорость воздействия

Препарат быстро проникает в ткани растения, его действие начинает проявляться уже через 2 - 3 часа

Плантенол Нео® работает даже при пониженных температурах (от 5 °C), но при повышении температуры скорость проникновения препарата в растения и его эффективность возрастают, достигая максимума при 25 °C



Плантенол Нео®

Период защитного действия

7 - 10 дней, в зависимости от инфекционной нагрузки и погодных условий. Лечащее действие проявляется в первые 1,5 дня после опрыскивания



Плантенол Нео®

Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, кг/га
Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	0,3
Вишня, черешня, слива	Монилиальный ожог	0,3 - 0,5
	Плодовая гниль	0,5

ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Кратность обработки

На всех культурах разрешено
проводить две обработки



ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Расход рабочей жидкости

На всех культурах – 1000 л/га



ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильнощелочной или сильноокислой реакцией

ФУНГИЦИД

Плантенол Нео®

Возможность возникновения
резистентности

При соблюдении рекомендуемых норм расхода и технологии применения препарата возникновение резистентности у патогенов маловероятно.

Ципродинил прекрасно вписывается в антирезистентные стратегии защиты сада

Плантенол Нео®

Свидетельство
о регистрации



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,3	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости –1000 л/га	60 (2)
0,3-0,5	Вишня, черешня, слива	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое- до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	5 (2)
0,5	Вишня, черешня, слива	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
3 г/ 10 л воды	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	60 (2)
3-5 г/ 10 л воды	Вишня, черешня, слива	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое - до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	5 (2)
5 г/ 10 л воды	Вишня, черешня, слива	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое– при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.



Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня; ручных работ – 7 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных работ в личном подсобном хозяйстве – 3 дня.


Мобильные приложения




Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com