

ФУНГИЦИД

Ланцея®

протиоконазол, 125 г/л +
пикоксистробин, 100 г/л

**Мощный эффект,
длительный контроль**



фунгицид

Ланцея®

Общая информация



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Общая характеристика

avgust crop protection

Системный двухкомпонентный фунгицид для защиты широкого спектра культур, отвечающий современным требованиям борьбы с болезнями растений



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Общая характеристика

avgust crop protection

**протиоконазол, 125 г/л +
пикоксистробин, 100 г/л**

Препаративная форма
концентрат микроэмульсии

Культуры

зерновые культуры, соя, горох, нут,
люпин, чечевица, подсолнечник,
кукуруза, рапс, рис

Спектр действия
комплекс болезней

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Преимущества

- быстрое поглощение и проникновение в ткани листа благодаря системному действию пикоксистробина из класса стробилуринов
- широкий спектр действия и длительный период защиты благодаря содержанию протиоконазола из класса триазолов
- длительный защитный период и активность в паровой фазе
- озеленяющий эффект на растения
- эффективность при температуре от 10 °C

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Механизм действия

Обладает трансламинарным и системным действием.

Протиоконазол проявляет лучшие качества препаратов из класса триазолов. Характеризуется высокой фунгицидной активностью и широким спектром действия. Обладает умеренным системным действием, более равномерно распределяется в тканях листьев и проявляет мощный лечащий эффект. Оказывает более длительное профилактическое действие

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Механизм действия

Пикоксистробин относится к классу стробилуринов. Быстро и мощно тормозит рост и развитие мицелия грибов. Обладает системным действием, перемещается по ксилеме. За счет газовой фазы защищает растения за пределами обработанной поверхности и способствует перераспределению препарата.

Проявляет длительное профилактическое и лечашее действие. Способствует лучшему развитию растений и устойчивости их к стрессовым факторам

Ланцея®

Скорость воздействия

**Защитное, антиспорирующее действие обеспечивает сразу после обработки.
Системно перемещается и распределяется по растению в течение нескольких часов после обработки**



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Период защитного действия

**До 4 недель с момента обработки
в зависимости от погодных
условий и инфекционной нагрузки**



Ланцея®

Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га
Пшеница озимая	Бурая и желтая ржавчина, септориоз колоса, пиренофороз, мучнистая роса, церкоспореллезная гниль корневой шейки	0,8 - 1
	Фузариоз колоса	1,6
Ячмень яровой и озимый	Сетчатая и темно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз	0,8 - 1
Рис	Пирикуляриоз	0,8 - 1,2

Ланцея®

Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га
Соя	Альтернариоз, пероноспороз, септориоз, аскохитоз, церкоспороз	0,8 - 1,2
Горох	Аскохитоз, антракноз, ржавчина	
Нут	Аскохитоз	
Люпин	Антракноз, бурая пятнистость	
Чечевица	Аскохитоз	

Ланцея®

Регламенты применения

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, л/га
Подсолнечник	Белая гниль (склеротиниоз), ржавчина, серая гниль, альтернариоз, фомоз, ложная мучнистая роса	0,8 - 1,2
Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориоз, плесневение початков	
Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз)	

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Особенности применения

avgust 
crop protection

Срок ожидания на рисе
50 дней, на люпине – не
регламентируется, на всех
остальных культурах – 40 дней

Кратность обработки на
ячмене, рапсе яровом, кукурузе ,
рисе – 1 за сезон, на остальных
культурах – 2

Ланцея®

Рабочий раствор

На рисе – **300** л/га, рапсе – **200 - 400**, кукурузе и подсолнечнике – **300 - 400**,
на остальных культурах – **200 - 300** л/га



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильнощелочной или сильноокислой реакцией.

Однако во всех случаях при приготовлении баковых смесей необходимо проверять физическую и химическую совместимость их компонентов

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Возможность
возникновения
резистентности

Является смесевым препаратом на основе двух действующих веществ с различным механизмом действия, что существенно снижает риск возникновения резистентности у патогенов

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Испытания



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Полевой
производственный опыт

avgust crop protection

Культура:

озимая пшеница сорта Снегурка

Срок обработки:

фаза колошения пшеницы

Норма расхода препарата:

1 л/га

**Воронежская область,
ЗАО «Агрофирма Павловская
Нива»**

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Растения в фазе ранней молочной спелости



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Растения в фазе
молочной спелости



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Растения в фазе молочной спелости



Ланцея

Ланцея®



Ланцея

ФИО докладчика. Наименование подразделения



Контроль без обработки

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Растения в фазе
молочной спелости



ФУНГИЦИД

Ланцея®

Растения в фазе молочно-восковой спелости



Ланцея

Ланцея®



Ланцея

ФИО докладчика. Наименование подразделения



Контроль без обработки

ФУНГИЦИД

Ланцея®

Растения в фазе
созревания (30 дней
после обработки)



Ланцея®

Растения в фазе созревания (30 дней после обработки)




Ланцея



Контроль без обработки


Ланцея®

Биологическая эффективность, %



Ланцея®

Урожайность, ц/га



Свидетельство о регистрации

 МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА	
№ 4538	от « 3 » мая 2024 г.
Настоящее свидетельство выдано	
АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958	
(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)	
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ	
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»	
пестицид Ланцея, КМЭ (125 г/л протиоконазола + 100 г/л пикоксистробина)	
(наименование пестицида или агрохимиката)	
получил государственную регистрацию за № 021-02-4538-1	
на срок по « 2 » мая 2034 г. и допускается к обороту на	
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:	
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов	
 	
М. П.	
№005091	

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,8 -1,0	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, септориоз колоса, пиренофороз, мучнистая роса, желтая ржавчина, церкоспореллезная гниль корневой шейки	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 14 – 21 день. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	40 (2)
1,6		Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: в фазе конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	40 (1)
0,8-1,0	Ячмень озимый, яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	40 (1)
0,8-1,2	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало выметывания метелки. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.	40 (1)
0,8-1,2	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, белая гниль или склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости – 200 - 400 л/га	40 (1)

Ланцея®

Свидетельство
о регистрации

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Ланцея, КМЭ (125 г/л протиоконазола + 100 г/л пикоксистробина) от 3 мая 2024 г. № 4538

1	2	3	4	5
0,8-1,2	Ряпс озимый	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, белая гниль или склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости – 200 - 400 л/га	40 (2)
0,8-1,2	Горох	Аскохитоз, ржавчина, антракноз	Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40 (2)
	Соя	Альтернариоз, пероноспороз, септориоз, аскохитоз, церкоспороз		
	Чечевица	Аскохитоз		
	Нут	Аскохитоз		
	Люпин	Антракноз, бурая пятнистость		- (2)
0,8-1,2	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориоз, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий или вымётывание метёлок Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40 (1)
0,8-1,2	Подсолнечник	Белая гниль или склеротиниоз, ржавчина, серая гниль, альтернариоз, фомоз, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации, первое - при появлении первых признаков болезни, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га.	40 (2)

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом.



Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Мобильные приложения



Каталог продукции
для России и Беларуси



Август Чекер.
Защита от контрафакта





С нами расти легче

avgust.com