

ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

никосульфурон, 260 г/кг +
трибенурон-метил, 235 г/кг +
римсульфурон, 150 г/кг +
флорасулам, 30 г/кг

**Сорняки на свекле –
больше не проблема!**



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®



Общая информация

ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Общая характеристика

Гербицид для контроля двудольных и злаковых сорняков на парах и в посевах гибридов сахарной свеклы, устойчивых к ALS-ингибиторам



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Общая характеристика

Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы

Культура, объект
свекла сахарная, гибриды, устойчивые
к ALS-ингибиторам, пары

Спектр действия
однолетние и некоторые многолетние
двудольные и злаковые сорняки

**Никосульфурон, 260 г/кг +
трибенурон-метил, 235 г/кг +
римсульфурон, 150 г/кг +
флорасулам, 30 г/кг**

Эмбоди Сенс®

Преимущества

- контроль максимального спектра сорняков на устойчивых гибридах сахарной свеклы
- уничтожение переросших растений мари, щирицы и горцев
- контроль повилики в течение всего сезона
- отсутствие необходимости в препарате-партнере
- применение независимо от фазы развития культуры
- безопасность в севообороте
- совместимость с фунгицидами и инсектицидами (кроме ФОС)

Эмбоди Сенс®

Спектр действия

Чувствительны:

- амброзия полыннолистная
- марь белая
- щирица запрокинутая
- горцы (виды)
- горчица полевая
- подсолнечник (падалица)
- редька дикая
- осот (виды)
- просо (виды)
- щетинник (виды)
- овсюг
- пырей ползучий
- просвирник пренебреженный
- канатник Теофраста
- гулявник (виды)
- дескурайния Софии
- пикульник (виды)
- подмаренник цепкий
- аистник цикотовый
- повилика

Среднечувствительны:

- бодяк (виды)
- латук (виды)
- чистец (виды)

Слабочувствительны:

- вьюнок полевой
- молочай (виды)

ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Механизм действия

никосульфурон, трибенурон-метил, римсульфурон и флорасулам являются ингибиторами ацетолактатсинтетазы (ALS)



Эмбоди Сенс®

Скорость воздействия

Рост чувствительных сорных растений прекращается через несколько часов после обработки. Значительно сокращается потребление питательных веществ и воды. Видимые симптомы проявляются через 2 - 3 дня после опрыскивания. Гибель сорных растений наступает в течение 2 - 3 недель после обработки



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Период защитного
действия

**До появления новой
волны всходов
сорняков**



Эмбоди Сенс®

Регламенты применения

Культура	Способ и сроки обработки	Норма расхода препарата, кг/га
Свекла сахарная, гибриды, устойчивые к ALS-ингибиторам	Опрыскивание в период вегетации	0,1
Пары, участки, не предназначенные под посев или высадку культурных растений	Обработка нежелательной растительности на паровых полях	0,1 - 0,2

Эмбоди Сенси®

Особенности применения

- Эмбоди Сенси® применяется только в посевах гибридов сахарной свеклы, устойчивых к ALS-ингибиторам
- Рекомендуется проводить последовательное опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) совместно с ПАВ Адью®, 0,1%-й раствор
- Рабочий раствор следует использовать сразу после приготовления



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

avgust 
crop protection

Препарат фитотоксичен к широкому спектру как однодольных, так и двудольных травянистых растений. Через четыре месяца после применения препарата можно высевать озимые зерновые культуры, весной следующего года – любые культуры

Эмбоди Сенс®

Возможность возникновения резистентности

Поскольку препарат относится к классу ингибиторов ALS, при длительном применении на одних и тех же полях гербицидов из данной группы возможно формирование устойчивых биотипов сорных растений. Для предотвращения возникновения резистентности необходимо чередовать применение препарата с гербицидами с другими механизмами действия

ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Расход рабочей жидкости

50 - 300 л/га (в зависимости от типа распылителей)



Эмбоди Сенс®

Совместимость

Препарат совместим с различными пестицидами, за исключением препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией. В каждом конкретном случае необходимо проверять совместимость компонентов перед приготовлением баковой смеси, а готовую смесь оценивать на фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре. Не рекомендуется применять ФОС-инсектициды за 10 дней до и в течение 10 дней после применения Эмбоди Сенс®

ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Испытания



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Результаты применения

«Аврора», Липецкая область.

Действие на сорные растения **через 14 дней** после второй обработки



Эмбоди Сенс®



Эмбоди Сенс®



Контроль

ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенси®

Результаты применения

«Аврора», Липецкая область.

Действие на сорные
растения **через 30 дней**
после второй обработки




ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Результаты применения

«Добрыня», Липецкая область.

Действие на сорные растения **через 10 дней** после второй обработки



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Результаты применения

«Добрыня»,
Липецкая область.

Действие на сорные
растения **через 30 дней**
после второй обработки



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Результаты применения

КДВ, Орловская область.

Контроль на фоне обработки
Эмбоди Сенс **через 16 дней**
после второй обработки



ГЕРБИЦИД

Эмбоди Сенс®

Результаты применения

КДВ, Орловская область.

Действие на сорные растения **через 30 дней** после второй обработки



Эмбоди Сенс®

Выписка из реестра пестицидов и агрохимикатов

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ФИРМА "АВГУСТ", ОГРН 1025006038958

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Эмбоди Сенс, ВДГ (260 г/кг никосульфурона + 235 г/кг трибенурон-метила + 150 г/кг
римсульфурина + 30 г/кг флорасулама)
(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:
номер государственной регистрации 021-03-10046-0
дата государственной регистрации 14 июля 2026 г.
на срок по 13 июля 2029 г. и допущенный к обороту
на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (крат- ность обрабо- ток) ¹	Сроки безопасного выхода из обработанных площадей для проведения ручных и механизиро- ванных работ
1	2	3	4	5	6
0,1-0,2 кг/га	Пшеница	Однолетние и многолетние, двудольные и лазовые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период активного роста с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Альфа, Ж (900 г/л этоксилата изопропанола спирта). Ограничения по севообороту: через четыре месяца после применения препарата можно высевать озимые зерновые культуры, весной следующего года – любые культуры. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	- (1)	-3

0,075-0,1 кг/га	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к ALS ингибиторам)	Однолетние и многолетние, двудольные и лазовые сорные растения	Послеуборочное опрыскивание посевов в фазе 2 листьев сорных растений (по первой и второй волне) с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Альфа, Ж (900 г/л этоксилата изопропанола спирта). Ограничения по севообороту: через четыре месяца после применения препарата можно высевать озимые зерновые культуры, весной следующего года – любые культуры. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	87 (2)	-3
-----------------	---	--	--	--------	----

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (крат- ность обрабо- ток) ¹	Сроки безопасного выхода из обработанных площадей для проведения ручных и механизиро- ванных работ
1	2	3	4	5	6
2-3 г/3 л воды	Участки, не предназначенные под посев или высадку культурных растений	Однолетние и многолетние, двудольные и лазовые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	- (1)	3/-

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне
водных объектов.

¹ Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.,
ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе»
(Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 14.07.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов
(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии)))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
3C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027

Сервисы «Августа»



**Каталог
продукции**



**Август Чекер.
Защита от контрафакта**



**Социальные
сети**



С нами расти легче

avgust.com