



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1740 от « 1 » февраля 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958 (взамен ранее выданного свидетельства о государственной регистрации от 9 июля 2015 г. № 696)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Кредо, СК (500 г/л карбендазима)

(наименование пестицида или агрохимиката)

021-02-1740-1

получил государственную регистрацию за № 8 июля 2025
на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А.Чекмарев



М. П.



№002105

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата (л/т, л/га)	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработки)
1	2	3	4	5
1-1,5	Пшеница озимая и яровая	Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян, снежная плесень, септориоз	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т	-(1)
0,3-0,6		Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), церкоспореллез, снежная плесень, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300л/га	40(1)
0,6		Фузариоз колоса		
0,5-0,6		Мучнистая роса, септориоз		40(2)
1-1,5	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т	-(1)
0,3-0,6		Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300л/га	40(1)
0,5-0,6		Мучнистая роса		40(2)
1-1,5	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т	-(1)
0,3-0,6		Снежная плесень, фузариозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300л/га	40(1)
0,5-0,6		Мучнистая роса		40(2)
0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса		30(3)

Запрещается применение препарата: личных подсобных хозяйствах, авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Срок выхода на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

