



МЕТАКСИЛ

avgust 
crop protection



Предупреждает и лечит болезни

ФУНГИЦИД

манкоцеб, 640 г/кг
+ металаксил, 80 г/кг

- Двойное действие — контактное и системное
- Защита от заражения патогенами снаружи и изнутри
- Длительный профилактический и лечащий эффект

Метаксил® – двухкомпонентный фунгицид контактного и системного действия для борьбы с болезнями картофеля, томатов, огурцов, лука и винограда

Препарат выпускается в форме смачивающегося порошка.

Метаксил® обладает профилактическим, лечащим и искореняющим контактно-системным действием.

Первое действующее вещество препарата – **металаксил** – обладает системным действием, в течение 0,5 – 1 ч после обработки проникает в растение через листья и стебли, перемещается акропетально, способно вылечить растение в случае ранней инфекции и защищает его в дальнейшем. Второе действующее вещество – **манкоцеб** – проявляет контактную активность, усиливает эффект созданием защитного слоя на поверхности листа.


Метаксил® обеспечивает защиту культуры от пероноспоровых грибов в течение 10 – 14 дней с момента обработки в зависимости от инфекционного фона и погодных условий.

Фунгицид используют для опрыскивания растений в период вегетации. Первая обработка – профилактическая, последующие – с интервалом 10 – 14 дней. Опрыскивать нужно молодые, активно растущие растения, так как по ним препарат передвигается быстрее. Максимальная кратность обработок – 3. Срок ожидания на огурцах и томатах открытого грунта – 10 дней, на винограде, картофеле и луке – 20 дней.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адъюванта Полифем®.

Метаксил® является комбинированным препаратом, состоящим из металаксила и манкоцеба, которые обладают разными механизмами действия, что существенно снижает риск возникновения резистентности. Во избежание развития устойчивости патогенов целесообразно чередовать применение Метаксила® с обработками фунгицидами из других химических классов, например, ацетамидов (Ордан®).

Метаксил® совместим в баковых смесях с пестицидами, имеющими нейтральную или кислую реакцию. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.



Расход рабочей жидкости, л/га

Для картофеля – 400

Для огурцов открытого грунта – 400 – 600

Для томатов открытого грунта – 300 – 500

Для лука – 600 – 800

Для виноградников – 800 – 1000

Упаковка

Пакеты по 2 кг; коробки по 1 кг

Культура	Заболевание	Норма расхода препарата, кг/га
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	2 – 2,5
Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	2,5
Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	2,5
Лук	Пероноспороз	2,5
Виноград	Милдью	2,5

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust crop protection